

Boraks glicerol 20 % vaginalne globule

vaginalne globule
boraks



3072

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!
Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše boleznii poslabšajo ali ne izboljšajo v 1 tednu, se morate posvetovati z zdravnikom.

Kaj vsebuje navodilo:

1. Kaj je zdravilo Boraks glicerol 20 % vaginalne globule in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Boraks glicerol 20 % vaginalne globule
3. Kako uporabljati zdravilo Boraks glicerol 20 % vaginalne globule
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Boraks glicerol 20 % vaginalne globule
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO BORAKS GLICEROL 20 % VAGINALNE GLOBULE IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Boraks glicerol 20 % vaginalne globule uporabljajte pri blažjih bakterijskih in glivičnih vnetjih nožnice. Namenjene so začetnemu zdravljenju vnetij nožnice ali dodatnemu zdravljenju kroničnih in ponavljajočih vnetij nožnice.

Vaginalne globule vsebujejo boraks, ki deluje protibakterijsko, protiglivično in zaščitno na sluznico nožnice.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO BORAKS GLICEROL 20 % VAGINALNE GLOBULE

Ne uporabljajte zdravila Boraks glicerol 20 % vaginalne globule

- če ste alergični na katero od sestavin zdravila.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom uporabe zdravila se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če se znaki vaše boleznii poslabšajo ali ne izboljšajo v 1 tednu, se morate posvetovati z zdravnikom.

Ob pojavu močnejšega izcedka iz nožnice, močno obarvanega izcedka oziroma izcedka, ki ima neprijeten vonj, je nujen obisk zdravnika.

Občasno se lahko ob uporabi Boraks glicerol 20 % vaginalnih globul pojavi voden izcedek iz nožnice, ki je popolnoma neškodljiv. Ob pojavu izcedka vam svetujemo uporabo zaščitnih vložkov, ne smete pa uporabljati tamponov.

Zdravilo uporabljajte vsak dan brez vmesnih prekinitev, predpisano število dni; zdravljenja ne prekinite predčasno brez posveta z zdravnikom, čeprav znaki obolenja že ponehajo, saj se ti lahko ponovijo ob prezgodnji prekinitvi uporabe zdravila.

Izogibajte se dolgotrajni uporabi zdravila - ob kroničnih in ponavljajočih vnetjih nožnice je nujen posvet z zdravnikom.

Ni za uživanje!

Otroci in mladostniki

Ob pojavu kakršnihkoli ginekoloških težavah pri otrocih in mladostnikih je nujen posvet z zdravnikom.

Druga zdravila in zdravilo Boraks glicerol 20 % vaginalne globule

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če uporabljate, ste pred kratkim uporabljali ali pa boste morda začeli uporabljati katero koli drugo zdravilo.

Ni poročil o medsebojnem delovanju Boraks glicerol 20 % vaginalnih globul z drugimi zdravili. Zdravila ne vstavljajte v nožnico sočasno z drugimi zdravili za vaginalno uporabo in vaginalnimi kontraceptivi, saj se učinkovitost teh lahko zmanjša zaradi izločanja iz nožnice.

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Ni podatkov o varnosti uporabe Boraks glicerol 20 % vaginalnih globul med nosečnostjo in dojenjem.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi Boraks glicerol 20 % vaginalne globule vplivale na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

Zdravilo Boraks glicerol 20 % vaginalne globule vsebuje metilparahidroksibenzoat in propilparahidroksibenzoat

To zdravilo vsebuje metilparahidroksibenzoat (E218) in propilparahidroksibenzoat (E216), ki lahko povzročita alergijske reakcije (lahko zapoznele).

3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO BORAKS GLICEROL 20 % VAGINALNE GLOBULE

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Zvečer pred spanjem vstavite v nožnico 1 do 2 vaginalni globuli.

Vaginalno globulo uporabite tako, da pretrgate dvojni trak po zarezi, izluščite vaginalno globulo in jo vstavite s konico naprej globoko v nožnico. Postopek najlažje izvedete leže na hrbtu z rahlo pokrčenimi nogami. Če je nožnica suha, lahko pred uporabo vaginalno globulo nekoliko navlažite pod tekočo vodo.

Zdravljenje običajno traja 5 do 7 dni, razen če vam je zdravnik drugače predpisal.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Boraks glicerol 20 % vaginalne globule, kot bi smeli

Če ste uporabili večji odmerek zdravila, kot bi smeli, in se ob tem pojavijo neželeni učinki, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Ni poročil o primerih prevelikega odmerka Boraks glicerol 20 % vaginalnih globul.

Če ste pozabili uporabiti zdravilo Boraks glicerol 20 % vaginalne globule

Ne uporabite dvojnega odmerka, če ste pozabili uporabiti prejšnji odmerek.

Nadaljujte z uporabo zdravila v skladu z navodilom za uporabo.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Boraks glicerol 20 % vaginalne globule lahko povzročijo preobčutljivostne reakcije in draženje vaginalne sluznice, ki se kaže kot pekoč občutek ter rdečina.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu.

O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na nacionalni center za poročanje:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco, Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22, SI-1000 Ljubljana

telefon: +386 (0)8 2000 500, faks: +386 (0)8 2000 510

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si, spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA BORAKS GLICEROL 20 % VAGINALNE GLOBULE

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! Shranjujte na suhem mestu, pri temperaturi do 25 °C.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini poleg oznake »Uporabno do:«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvrči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. VSEBINA PAKIRANJA IN DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Boraks glicerol 20 % vaginalne globule

1 vaginalna globula vsebuje 680 mg boraksa.

Pomožne snovi: prečiščena voda, glicerol (E422), želatina (E441), metilparahidroksibenzoat (E218), propilparahidroksibenzoat (E216).

Izgled zdravila Boraks glicerol 20 % vaginalne globule in vsebina pakiranja

Boraks glicerol 20 % vaginalne globule so mehke vaginalne globule, koničaste oblike, prozorne, rumenkaste barve.

Pakiranje je škatla, v kateri je 10 vaginalnih globul (2 x 5 vaginalnih globul v dvojnem traku, v plastični vrečki), s priloženim navodilom za uporabo.

Način izdaje zdravila Boraks glicerol 20 % vaginalne globule

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah. Izdelek je galensko zdravilo.

Proizvajalec

Gorenjske lekarnе, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj

enota Galenski laboratorij, Bleiweisova cesta 8, 4000 Kranj

telefon: 04 20 16 159, faks: 04 20 16 157, e-pošta: g.laboratorij@gorenjske-lekarne.si

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 20. 1. 2021.



gorenjske lekarnе