

Kapljice za želodec

peroralne kapljice, raztopina



3642

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!
Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 2 tednih, se morate posvetovati z zdravnikom.

Kaj vsebuje navodilo:

1. Kaj je zdravilo Kapljice za želodec in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Kapljice za želodec
3. Kako uporabljati zdravilo Kapljice za želodec
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Kapljice za želodec
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO KAPLJICE ZA ŽELODEC IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Kapljice za želodec uporabljajte pri prebavnih, predvsem želodčnih težavah. Pomagajo pri premajhnem izločanju prebavnih sokov, pomanjkanju apetita, prebavnih krčih, napihnjenosti in napenjanju.

To je tradicionalno zdravilo rastlinskega izvora, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.

Peroralne kapljice vsebujejo tekoči ekstrakt plodov navadne kumine, korenin rumenega svišča, zeli navadne tavžentrože in cvetov prave kamilice. Korenine rumenega svišča in zeli navadne tavžentrože vsebujejo grenčine, ki spodbujajo apetit, povečujejo izločanje prebavnih sokov, krepijo gibanje želodca in črevesja ter tako izboljšujejo prebavo. Plodovi navadne kumine in cvetovi prave kamilice vsebujejo eterično olje in druge učinkovine, ki pomirjajo krče v prebavilih, olajšujejo izločanje črevesnih plinov, preprečujejo napenjanje in delujejo protibakterijsko. Učinkovine cvetov prave kamilice delujejo tudi protivnetno in zaščitno pri razjedah na želodcu.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO KAPLJICE ZA ŽELODEC

Ne uporabljajte zdravila Kapljice za želodec

- če ste alergični na katero od sestavin zdravila, brezo, rastline iz družine kobulnic (latinsko Apiaceae) in nebinovk (latinsko Asteraceae)
- če imate razjede na želodcu
- otroci, mlajši od 12 let.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom uporabe zdravila se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 2 tednih, se morate posvetovati z zdravnikom.

Ob pojavu hudih trebušnih bolečin je nujen obisk zdravnika.

Previdnost je potrebna ob uporabi Kapljic za želodec pri obolenjih jeter in žolčnih poti.

Otroci in mladostniki

Kapljic za želodec naj ne uporabljajo otroci, mlajši od 12 let.

Druga zdravila in zdravilo Kapljice za želodec

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če uporabljate, ste pred kratkim uporabljali ali pa boste morda začeli uporabljati katero koli drugo zdravilo.

Ni poročil o medsebojnem delovanju Kapljic za želodec z drugimi zdravili.

Zdravilo Kapljice za želodec skupaj s hrano in pijačo

Ni znano, da hrana ali pijača vplivata na učinkovitost Kapljic za želodec.

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Ni podatkov o varnosti uporabe Kapljic za želodec med nosečnostjo in dojenjem.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ob jemanju priporočenih odmerkov Kapljic za želodec ni pričakovati vpliva na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

Zdravilo Kapljice za želodec vsebuje etanol

To zdravilo vsebuje 70 vol % etanola (alkohola), to je do 780 mg alkohola na odmerek, kar ustreza 19,3 ml piva oziroma 8,1 ml vina na odmerek. Škodljivo je za tiste, ki trpijo za alkoholizmom. Na vsebnost alkohola morajo biti pozorne nosečnice in doječe matere, otroci in skupine z velikim tveganjem, kot so bolniki z jetrnimi obolenji ali epilepsijo.

3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO KAPLJICE ZA ŽELODEC

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Vzemite trikrat dnevno po 20 do 30 kapljic. Kapljice nakapajte v pol kozarca vode in popijte. Pri pomanjkanju apetita vzemite Kapljice za želodec pol do eno uro pred obrokom, pri slabi prebavi pa po obroku.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Kapljice za želodec, kot bi smeli

Če ste uporabili večji odmerek zdravila, kot bi smeli, in se ob tem pojavijo neželeni učinki, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Preveliko odmerjanje Kapljic za želodec lahko povzroči znake alkoholiziranosti. Količina alkohola pri prevelikem odmerjanju lahko spremeni učinke drugih zdravil. Lahko tudi zmanjša sposobnost vožnje ali upravljanja s stroji.

Če ste pozabili uporabiti zdravilo Kapljice za želodec

Ne uporabite dvojnega odmerka, če ste pozabili uporabiti prejšnji odmerek.

Nadaljujte z uporabo zdravila v skladu z navodilom za uporabo.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Kapljice za želodec lahko povzročijo preobčutljivostne reakcije.

Zdravilo vsebuje tekoči ekstrakt cvetov prave kamilice, za katero obstajajo poročila o hujših preobčutljivostnih reakcijah (pogostost ni znana).

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu.

O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na nacionalni center za poročanje:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco, Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22, SI-1000 Ljubljana

telefon: +386 (0)8 2000 500, faks: +386 (0)8 2000 510

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si, spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA KAPLJICE ZA ŽELODEC

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C. Po uporabi stekleničko takoj dobro zaprite.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini poleg oznake »Uporabno do:«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. VSEBINA PAKIRANJA IN DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Kapljice za želodec

1 ml peroralnih kapljic, raztopine (22 kapljic) vsebuje tekoči ekstrakt plodov navadne kumine (*Carum carvi* L., fructus), korenin rumenega svišča (*Gentiana lutea* L., radix), zeli navadne tavžentrože (*Centaurium species*, herba) in cvetov prave kamilice (*Matricaria recutita* L., flos), ki ustreza 45 mg plodov navadne kumine, 45 mg korenin rumenega svišča, 45 mg zeli navadne tavžentrože in 45 mg cvetov prave kamilice. Ekstrakcijsko topilo: 70-odstotni etanol. Pomožne snovi: etanol, prečiščena voda.

Izgled zdravila Kapljice za želodec in vsebina pakiranja

Kapljice za želodec so bistra, svetlo rjava tekočina, značilnega vonja po zeliščih.

Pri tekočih zdravilih rastlinskega izvora lahko nastane med shranjevanjem rahla usedlina.

Pakiranje je škattla s kapalno stekleničko, v kateri je 50 ml peroralnih kapljic, raztopine, s priloženim navodilom za uporabo.

Način izdaje zdravila Kapljice za želodec

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah. Izdelek je galensko zdravilo.

Proizvajalec

Gorenjske lekarne, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj

enota Galenski laboratorij, Bleiweisova cesta 8, 4000 Kranj

telefon: 04 20 16 159, faks: 04 20 16 157, e-pošta: g.laboratorij@gorenjske-lekarne.si

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 20. 1. 2021.

