



Mazilo pri nahodu in prehladu

mazilo

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 1 tednu, se morate posvetovati z zdravnikom.

Kaj vsebuje navodilo:

1. Kaj je zdravilo Mazilo pri nahodu in prehladu in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Mazilo pri nahodu in prehladu
3. Kako uporabljati zdravilo Mazilo pri nahodu in prehladu
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Mazilo pri nahodu in prehladu
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO MAZILO PRI NAHODU IN PREHLADU IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Mazilo pri nahodu in prehladu lajša dihanje in izkašljevanje pri zamašenih dihalnih poteh ob prehladnih obolenjih. Pomaga tudi pri vnetjih nosne sluznice in obnosnih votlin. Mazilo vsebuje levomentol, racemno kafro ter eterična olja poprove mete, evkalipta in terpentina, ki povzročajo prijeten občutek hlajenja in lažjega dihanja, redčijo sluz v dihalnih poteh ter pospešujejo njeno izločanje. Delujejo tudi antiseptično.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO MAZILO PRI NAHODU IN PREHLADU

Ne uporabljajte zdravila Mazilo pri nahodu in prehladu

- če ste alergični na katero od sestavin zdravila, 1,8-cineol ali mentol
- otroci, mlajši od 2 let.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom uporabe zdravila se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 1 tednu, se morate posvetovati z zdravnikom.

Ob pojavu oteženega dihanja, vročine ali gnojnega izpljunka je potreben obisk zdravnika. Pri otrocih je potrebna previdnost ob nanašanju Mazila pri nahodu in prehladu na predel obraza.

Zdravila ne vnašajte v notranjost nosne votline.

Zdravilo ne sme priti v stik z očmi, usti in sluznicami; če se to zgodi, prizadete predele izpirajte z veliko količino mlačne vode.

Samo za zunanjo uporabo!

Otroci in mladostniki

Mazila pri nahodu in prehladu naj ne uporabljajo otroci, mlajši od 2 let.

Druga zdravila in zdravilo Mazilo pri nahodu in prehladu

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če uporabljate, ste pred kratkim uporabljali ali pa boste morda začeli uporabljati katero koli drugo zdravilo.

Ni poročil o medsebojnem delovanju Mazila pri nahodu in prehladu z drugimi zdravili.

Odsvetujemo sočasno nanašanje Mazila pri nahodu in prehladu in drugih zdravil na predele kože, ki so navedeni v poglavju Kako uporabljati Mazilo pri nahodu in prehladu.

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Ni podatkov o varnosti uporabe Mazila pri nahodu in prehladu med nosečnostjo in dojenjem.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi Mazilo pri nahodu in prehladu vplivalo na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILU MAZILO PRI NAHODU IN PREHLADU

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Pri zamašenih zgornjih dihalnih poteh ter vnetjih nosne sluznice in obnosnih votlin nanesite Mazilo pri nahodu in prehladu večkrat dnevno v tankem sloju pod nosnici.

Pri prehladnih obolenjih lahko mazilo vtrete tudi v kožo na predel prsi in hrbta ter namazani predel grejete; postopek lahko ponovite do trikrat dnevno.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Mazilo pri nahodu in prehladu, kot bi smeli

Če ste uporabili večji odmerek zdravila, kot bi smeli, in se ob tem pojavijo neželeni učinki, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Preveliko odmerjanje Mazila pri nahodu in prehladu lahko povzroči draženje kože.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila, kot bi smeli, kožo temeljito sperite s tekočo vodo.

Če ste pozabili uporabiti zdravilo Mazilo pri nahodu in prehladu

Ne uporabite dvojnega odmerka, če ste pozabili uporabiti prejšnji odmerek.

Nadaljujte z uporabo zdravila v skladu z navodilom za uporabo.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Mazilo pri nahodu in prehladu lahko povzroči draženje kože in preobčutljivostne reakcije.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu.

O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na nacionalni center za poročanje:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco, Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22, SI-1000 Ljubljana

telefon: +386 (0)8 2000 500, faks: +386 (0)8 2000 510

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si, spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA MAZILO PRI NAHODU IN PREHLADU

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini poleg oznake »Uporabno do:«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. VSEBINA PAKIRANJA IN DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Mazilo pri nahodu in prehladu

1 g mazila vsebuje 5 mg levomentola, 4 mg eteričnega olja poprove mete (*Mentha x piperita*, aetheroleum), 4 mg eteričnega olja evkalipta (*Eucalyptus species*, aetheroleum),

4 mg eteričnega olja terpentina (*Pinus species*, aetheroleum) in 2 mg racemne kafe.

Pomožna snov: beli vazelin.

Izgled zdravila Mazilo pri nahodu in prehladu in vsebina pakiranja

Mazilo pri nahodu in prehladu je mazilo, bele barve, značilnega vonja po mentolu, kafri in eteričnih oljih.

Pakiranje je škatla z aluminijasto tubo, v kateri je 20 g mazila, s priloženim navodilom za uporabo.

Način izdaje zdravila Mazilo pri nahodu in prehladu

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah. Izdelek je galensko zdravilo.

Proizvajalec

Gorenjske lekarne, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj

enota Galenski laboratorij, Bleiweisova cesta 8, 4000 Kranj

telefon: 04 20 16 159, faks: 04 20 16 157, e-pošta: g.laboratorij@gorenjske-lekarne.si

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 20. 1. 2021.

