

## NAVODILO ZA UPORABO

**Hepan 500 i.e./5 mg v 1g gel**  
natrijev heparinat/dekspantenol

### **Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!**

Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če se znaki vaše bolezni ne izboljšajo v 1 do 2 tednih, se posvetujte z zdravnikom.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

### **Navodilo vsebuje:**

1. Kaj je zdravilo Hepan gel in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Hepan gel
3. Kako uporabljati zdravilo Hepan gel
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Hepan gel
6. Dodatne informacije

## **1. KAJ JE ZDRAVILO HEPAN GEL IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO**

Natrijev heparinat po absorpciji prek kože preprečuje strjevanje krvi ter tako deluje preventivno proti nastajanju krvnih strdkov v ožilju, pa tudi terapevtsko na že nastale krvne strdke. Delovanje natrijevega heparinata okrepi dodani dekspantenol, vitamin, ki ob lokalni uporabi na koži spodbuja tvorbo epitela (mehča kožo in pospešuje njeno obnavljanje) ter tako zmanjšuje draženje kože.

Zdravilo Hepan gel se uporablja za lokalno zdravljenje površinskega tromboflebitisa (t.j. omejenega vnetja površinskih ven in stanj, nastalih kot posledica tromboze površinskih ven).

## **2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO HEPAN GEL**

### **Ne uporabljajte zdravila Hepan gel**

- če ste preobčutljivi za (alergični na) natrijev heparinat, dekspantenol ali katerokoli sestavino zdravila Hepan gel
- pri otrocih, mlajših od 5 let.

Hepan gel se lahko uporablja le pri odraslih in otrocih nad 5 let starosti.

### **Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila Hepan gel**

- kadar uporabljate zdravilo Hepan gel morate paziti, da zdravilo ne pride v oči, na sluznico ali na odprte rane ter na okužene predele kože.

### **Uporaba drugih zdravil**

Ni bilo poročil o interakcijah pri lokalni uporabi drugih zdravil sočasno z zdravilom Hepan gel.

### **Nosečnost in dojenje**

Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

Neželenih učinkov lokalne uporabe natrijevega heparinata in dekspantenola med nosečnostjo in dojenjem niso opazili.

### **Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev**

Zdravilo Heparan gel nima vpliva na sposobnost vožnje in upravljanja strojev.

### **Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Heparan gel**

Metilparahidroksibenzoat (E218) in propilparahidroksibenzoat (E216) lahko povzročita alergijske reakcije (lahko zapoznele). Propilenglikol (E 1520) lahko povzroči draženje kože.

## **3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO HEPAN GEL**

Pri uporabi zdravila Heparan gel natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Zdravilno Heparan gel nanesite na boleče, vneto področje ven dva do štirikrat na dan, v tanki plasti in brez vtiranja v kožo. Vnet predel nato prekrijte z gazo in ga povijte.

Dolžina zdravljenja je odvisna od indikacije – najpogosteje traja od 1 do 2 tedna, v kroničnih primerih pa tudi več tednov. Daljša uporaba zdravila mora potekati pod zdravniškim nadzorom.

Zdravilo Heparan se lahko uporablja pri odraslih in otrocih, starejših od 5 let.

### **Če ste uporabili večji odmerek zdravila Heparan gel, kot bi smeli**

Ni poročil o primerih prevelikega odmerjanja.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

## **4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI**

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Heparan gel neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Zelo redko neželeni učinek (pojavijo se pri največ 1 od 10 000 bolnikov): na koži se pojavi srbenje, pordelost in občutek zbadanja.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

## **5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA HEPAN GEL**

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte pri temperaturi do 25°C.

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

## **6. DODATNE INFORMACIJE**

### **Kaj vsebuje zdravilo Heparan gel**

Zdravilni učinkovini sta natrijev heparinat in dekspantenol. 1 g gela vsebuje 500 i.e. natrijevega heparinata in 5 mg dekspantenola.

- Pomožne snovi so glicerol (E 422), karbomer, etanol 96 odstotni, metilparahidroksibenzoat (E 218), propilparahidroksibenzoat (E 216), propilenglikol (E 1520), trolamin, prečiščena voda.

**Izgled zdravila Hepan gel in vsebina pakiranja**

Škatla s 50 g gela v aluminijasti tubi.

**Način in režim izdaje zdravila**

Zdravilo se izdaja brez recepta v lekarnah.

**Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom**

Jadran-galenski laboratorij d.o.o. Ljubljana,

Litostrojska cesta 46 A,

SI - 1000 Ljubljana

Slovenija

**Izdelovalec**

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.,

Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvaška

**Navodilo je bilo odobreno 01.04.2014**