



Glogove kapljice

peroralne kapljice, raztopina
tekoči ekstrakt listov in cvetov gloga

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo, se morate posvetovati z zdravnikom.

Kaj vsebuje navodilo:

1. Kaj je zdravilo Glogove kapljice in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Glogove kapljice
3. Kako uporabljati zdravilo Glogove kapljice
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Glogove kapljice
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO GLOGOVE KAPLJICE IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Glogove kapljice uporabljajte po posvetu z zdravnikom pri blagi obliki srčne oslabelosti, srčnih motnjah psihičnega izvora ter kot podporo delovanju srca in krvnega obtoka.

To je tradicionalno zdravilo rastlinskega izvora, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.

Listi in cvetovi gloga vsebujejo oligomerne procianidine, flavonoide in druge učinkovine, ki povečujejo moč krčenja srčne mišice, izboljšujejo njeno prekrvavitev in blago znižujejo krvni tlak.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO GLOGOVE KAPLJICE

Ne uporabljajte zdravila Glogove kapljice

- če ste alergični na katero od sestavin zdravila
- otroci, mlajši od 18 let.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom uporabe zdravila se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo, se morate posvetovati z zdravnikom.

Obisk zdravnika je nujen pri otekanju nog, oteženem dihanju in bolečini v predelu srca, ki se širi v roke, zgornji del trebuha ali vrat.

Otroci in mladostniki

Glogovih kapljic naj ne uporabljajo otroci, mlajši od 18 let.

Druga zdravila in zdravilo Glogove kapljice

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če uporabljate, ste pred kratkim uporabljali ali pa boste morda začeli uporabljati katero koli drugo zdravilo.

Do medsebojnega učinkovanja lahko pride ob sočasni uporabi Glogovih kapljic z zdravili za zdravljenje zvišanega krvnega tlaka in digoksina (zdravilo za zdravljenje bolezni srca), zato ne uporabljajte Glogovih kapljic sočasno z navedenimi zdravili.

Zdravilo Glogove kapljice skupaj s hrano in pijačo

Ni znano, da hrana ali pijača vplivata na učinkovitost Glogovih kapljic.

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Zaradi pomanjkanja podatkov o varnosti odsvetujemo uporabo Glogovih kapljic med nosečnostjo in dojenjem.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ob jemanju priporočenih odmerkov Glogovih kapljic ni pričakovati vpliva na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

Zdravilo Glogove kapljice vsebuje etanol

To zdravilo vsebuje 78 vol % etanola (alkohola), to je do 823 mg alkohola na odmerek, kar ustreza 20,4 ml piva oziroma 8,6 ml vina na odmerek. Škodljivo je za tiste, ki trpijo za alkoholizmom. Na vsebnost alkohola morajo biti pozorne nosečnice in doječe matere, otroci in skupine z velikim tveganjem, kot so bolniki z jetrnimi obolenji ali epilepsijo.

3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO GLOGOVE KAPLJICE

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Vzemite trikrat dnevno po 20 do 30 kapljic. Kapljice nakapajte v pol kozarca vode in popijte.

Priporočljivo je, da Glogove kapljice jemljete redno vsaj 6 tednov, saj učinki nastopijo po nekaj tednih redne uporabe zdravila.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Glogove kapljice, kot bi smeli

Če ste uporabili večji odmerek zdravila, kot bi smeli, in se ob tem pojavijo neželeni učinki, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Preveliko odmerjanje Glogovih kapljic lahko povzroči znake alkoholiziranosti. Količina alkohola pri prevelikem odmerjanju lahko spremeni učinke drugih zdravil. Lahko tudi zmanjša vašo sposobnost vožnje ali upravljanja s stroji.

Če ste pozabili uporabiti zdravilo Glogove kapljice

Ne uporabite dvojnega odmerka, če ste pozabili uporabiti prejšnji odmerek.

Nadaljujte z uporabo zdravila v skladu z navodilom za uporabo.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. Glogove kapljice lahko povzročijo preobčutljivostne reakcije, slabost, prebavne težave, izpuščaje, omotico in glavobol.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu.

O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na nacionalni center za poročanje:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco, Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22, SI-1000 Ljubljana

telefon: +386 (0)8 2000 500, faks: +386 (0)8 2000 510

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si, spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA GLOGOVE KAPLJICE

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Po uporabi stekleničko takoj dobro zaprite.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini poleg oznake »Uporabno do:«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. VSEBINA PAKIRANJA IN DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Glogove kapljice

1 ml peroralnih kapljic, raztopine (23 kapljic) vsebuje tekoči ekstrakt listov in cvetov gloga (*Crataegus species, folium cum flore*), ki ustreza 185 mg listov in cvetov gloga.

Ekstrakcijsko topilo: 78-odstotni etanol. Pomožne snovi: etanol, prečiščena voda.

Izgled zdravila Glogove kapljice in vsebina pakiranja

Glogove kapljice so bistra, zelenorjava tekočina, značilnega vonja po zelišču.

Pri tekočih zdravilih rastlinskega izvora lahko nastane med shranjevanjem rahla usedlina.

Pakiranje je škatla s kapalno stekleničko, v kateri je 50 ml peroralnih kapljic, raztopine, s priloženim navodilom za uporabo.

Način izdaje zdravila Glogove kapljice

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah. Izdelek je galensko zdravilo.

Proizvajalec

Gorenjske lekarne, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj

enota Galenski laboratorij, Bleiweisova cesta 8, 4000 Kranj

telefon: 04 20 16 159, faks: 04 20 16 157, e-pošta: g.laboratorij@gorenjske-lekarne.si

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 2. 10. 2020.

